



***Retiboletus ornatipes***  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

## DESCRIPTION

**Nom Latin :** *Retiboletus ornatipes* (Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

**Nom Français :** Bolet à pied orné

**Taxon :** IUMQ0180

**Taxonomie :**

**Division :** Basidiomycota

**Sous-division :** Agaricomycotina

**Classe :** Agaricomycetes

**Sous-classe :** Incertain

**Ordre :** Boletales

**Sous-ordre :** Incertain

**Famille :** Boletaceae

**Genre :** *Retiboletus*

**Chapeau**

4-10 cm de diam., convexe puis subétalé, sec, finement tomenteux-fibrilleux, jaune, brun-vert à brun foncé, à marge unie

**Face poroïde**

Jaune puis jaune olivacé avec l'âge, brunissant au froissement

**Pores**

Ronds et petits, 1-2 par mm

**Couche(s) de tubes**

Concolore à la face poroïde

**Pied**

6-12 x 1-2 cm, égal, ventru à légèrement élargi vers la base, plein, sec, fortement réticulé sur toute la



***Retiboletus ornatipes***  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

longueur, jaune vif

**Chair**

jaunâtre à jaune vif, immuable ou brunissant à la coupe

**Odeur et saveur**

Odeur indistincte et saveur douce à souvent amère

**Sporée**

Brun olive

**Spores**

Oblongues à subfusiformes, obtuses à l'apex, lisses, brun pâle, jaunâtres dans le KOH, 10-12 x 3-4,5 µm

**Cystides hyméniales**

Fusifformes, à paroi mince, lisses, brunâtres à dorées dans le KOH, 35-50 x 5-7,5 µm

**Pileipellis**

En trichoderme collapsant :

formé d'éléments lisses, bruns, brunâtre doré à dorés dans le KOH, 2,5-10 µm de diam., avec cellules terminales subfusiformes à cylindriques, étroites à arrondies à l'apex

**Mode de croissance**

Solitaire ou cespiteux

**Écologie**

Mycorhizien :

sur sol sous chênes et hêtres



## *Retiboletus ornatipes* (Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

### Période

Août à mi-septembre

### Fréquence

Occasionnelle

### Comestibilité

Bon comestible, mais souvent trop amer pour être consommé

### Réactions chimiques

- orangée, brun orangé pâle, rouge orangé à rouge noirâtre foncé au KOH sur le chapeau
- grise au KOH sur la chair
- négative à orangée au NH<sub>4</sub>OH sur le chapeau
- négative à verdâtre au NH<sub>4</sub>OH sur la chair
- négative au FeSO<sub>4</sub> sur le chapeau et la chair

### Remarques

Ce bolet se caractérise par son pied jaune vif et grossièrement et entièrement réticulé.

La couleur de son chapeau est variable.

La manipulation de ce bolet éclatant tache les doigts de jaune.

Seuls les tubes jaunes permettent de distinguer à coup sûr ce bolet de *R. griseus*, beaucoup plus rare, à tubes blanchâtres à grisâtres au tout début. Ce dernier a souvent le pied envahi de jaune.

*Pulveroboletus retipes* (Berk. & Curt.) Singer (= *Boletus retipes* Berk. & Curt.) est un nom qui a été utilisé par certains auteurs pour désigner l'espèce décrite ci-dessus. La synonymie des deux taxons ne fait cependant pas l'unanimité. Pour plus de détails, voir Both (1993).



***Retiboletus ornatipes***  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

### Références

Bessette, A.E., Roody, W.C. & Bessette, A.R. (2016). Boletes of Eastern North America. Syracuse University Press.

Mille et un champignons du Québec, Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal, 2002.

Lamoureux, Y. & Després, J. (1997). Champignons du Québec, Tome 1 Les bolets. Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal.

Yves Lamoureux : [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

### Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

**Retiboletus ornatipes**  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

**PHOTOS MACROS**



© Georges Lachaine



© Jules Cimon



© Renée Lebeuf



© Gwenaël Cartier



© Roland Labbé




© Fernand Therrien



© Jacqueline Labrecque



© Jules Cimon



© Georges Lachaine

***Retiboletus ornatipes***  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

**PHOTOS MACROS**



© Yves Lamoureux



© Jacqueline Labrecque



© Renée Lebeuf



© Joseph Nuzzolese




© Gwenaël Cartier



© Marc Olivier Labrecque



© Jacqueline Labrecque



© Georges Lachaine



© Fernand Therrien

***Retiboletus ornatipes***  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

**ANNEXE : TABLEAUX COMPARATIFS**

<b>Tableau différentiel entre <i>Retiboletus griseus</i> et <i>Retiboletus ornatipes</i></b>		
<b>Caractères distinctifs</b>	<b><i>Retiboletus griseus</i></b>	<b><i>Retiboletus ornatipes</i></b>
<b>Chapeau :</b>	<b>gris / gris-brun</b>	<b>jaune / brun-vert / brun foncé</b>
<b>* Face poroïde au début :</b>	<b>blanchâtre / grisâtre</b>	<b>jaune</b>
<b>Pied au début:</b>	<b>blanchâtre jaunissant depuis la base avec l'âge</b>	<b>jaune vif</b>
<b>Chair au début :</b>	<b>blanchâtre</b>	<b>jaune vif</b>
<b>Saveur :</b>	<b>indistincte</b>	<b>douce / parfois amarescente</b>
<b>Roland Labbé : avril 2016.</b>		<b>* caractère discriminatoire principal</b>

© Roland Labbé



***Retiboletus ornatipes***  
(Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

## CLÉS D'IDENTIFICATIONS (1)

[Clé des espèces du genre \*Retiboletus\* au Québec](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022

Dernière mise-à-jour : 2024-05-20 01:30:55